

ĐA DẠNG LỚP THÚ

- Lớp thú hiện nay có khoảng 4600 loài. Ở Việt Nam đã phát hiện được 275 loài.
- Các loài thú đều có lông mao, tuyến sữa.

1. Bộ Thú huyệt

- Đại diện: thú mỏ vịt sống ở Châu Đại Dương
- Đặc điểm: Vừa sống ở nước ngọt, vừa ở cạn
- Cấu tạo
 - + Mỏ giống mỏ vịt, dẹp.
 - + Mắt nhỏ
 - + Bộ lông rậm mịn, mềm bao phủ cơ thể, không thấm nước, chân có màng bơi: thích nghi với đời sống bơi lội.
 - + Đuôi rộng, dẹp để dự trữ mỡ.
- Sinh sản
 - + Đẻ trứng: trứng được đẻ vào tổ làm bằng lá cây mục. Mỗi lần có thể sinh từ 1 – 3 trứng. Trứng sau 10 ngày ấp sẽ nở thành con.
 - + Thú cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú: nên chưa cho con bú. Thú mỏ vịt con uống sữa mẹ theo 2 cách:
 - Ép mỏ vào bụng mẹ cho sữa chảy ra. Sau đó, chúng liếm lông, lấy sữa vào mỏ.
 - Bơi theo mẹ, uống sữa do thú mẹ tiết ra hòa lẫn vào nước.

2. Bộ Thú túi

- Đại diện: Kanguru sống ở đồng cỏ Châu Đại Dương.
- Đặc điểm:
 - + Cao tới 2m.
 - + Mặt dài, răng dẹt và rộng để nhai cỏ
 - + Tay ngắn
 - + Túi được bọc lông: nơi ở của kanguru con
 - + Có chi sau khỏe: để nhảy nhanh. Nó có thể nhảy với vận tốc 40 – 50km/h
 - + Đuôi dài lông dày để giữ thăng bằng.
- Sinh sản:
 - + Đẻ con. Con sơ sinh chỉ lớn bằng hạt đậu, dài khoảng 3cm không thể tự bú mẹ, sống trong túi da ở bụng mẹ.
 - + Vú có tuyến sữa, vú tự tiết sữa và tự động chảy vào miệng của thú con.